

# RATSTOP max BLOCK

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κυρώδεις κύβους. (Μπλε χρώματος)

Εγγυημένη σύνθεση:  
Brodifacoum 0.0025% β/β  
Βοηθητικές ουσίες:  
99,9974% β/β

Περιέχει τον πικραντικό-  
αποτρεπτικό παράγοντα:  
denatonium benzoate

Προορίζεται για ερασιτέχνες (ευρύ κοινό)

Συσκευασία: 100g (10τεμ x 10g)



Αποκλειστική Διάθεση:  
ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.  
www.kiroefodia.gr

Κάτοχος της  
Έγκρισης Παρασκευαστής  
ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ  
Αριθμός Έγκρισης  
ΤΠ14-0131-5/3/2018



**ΧΡΗΣΗ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Κατά των αρουραίων και ποντικών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και περιμετρικά των κτιρίων.  
**Μέθοδος εφαρμογής:** Εφαρμογή δολωμάτων εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση ανά 5 μέτρα τουλάχιστον.  
**Δόση και συχνότητα εφαρμογής:** Α) Αρουραίοι: 100gr έως 200gr δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Β) Ποντικοί: 20-40gr δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Δολώματα σε μορφή κρυσθίων κύβων των 10gr ή 20gr.  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Ειδικές οδηγίες χρήσης κατά των ποντικών και αρουραίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και περιμετρικά των κτιρίων: Η τοποθέτηση των σταθμών δόλωσης να γίνεται σε χώρους που δεν πλημμυρίζουν. Οι σταθμοί δόλωσης να επιθεωρούνται κάθε 2 με 3 ημέρες για ποντικούς και 5 με 7 ημέρες για τους αρουραίους κατά την πρώτη εφαρμογή και ανά εβδομαδιαία διαστήματα στις επόμενες εφαρμογές ώστε να ελέγχεται η κατανάλωση του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Επαναδολώνονται εάν χρειάζεται.

**Γενικές οδηγίες χρήσης:** Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν τη χρήση του. Πριν από κάθε χρήση τρωκτοκτόνων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες). Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή των δολωμάτων. Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου έχει παρατηρηθεί προηγούμενη δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, φωλιές, τρύπες, λαγυμιά, κλπ.). Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή άλλες κατάλληλες κατασκευές. Τοποθετήστε τους σταθμούς δόλωσης μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους. Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκέλη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος. Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ:** Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε φαινόμενα δολώματα και τη συσκευασία τους σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: H373** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P102:** Μακριά από παιδιά. **P301+P310:** Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμ βουλευθείτε γιατρό. **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις αναγραφόμενες οδηγίες (προφυλάξεις και πρώτες βοήθειες), πριν από την χρήση. **Γενικά Μέτρα**

**Μετριάσιμους Κινδύνους:** Μην το χρησιμοποιείτε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. βουλωμα τρυπάν, απομακρυνση πιθανών εστιών τροφής και πόσιμου νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επαναπροβολής. Μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την ανίχνευση της δραστηριότητας των τρωκτικών). Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιστημονούνται κατάλληλα ώστε να αναφέρουν τα παρακάτω: Μην μετακινείτε ή ανοίγετε. Περιέχει το τρωκτοκτόνο Ratstop Max Block με Brodifacoum 0.0025%. Σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο **Κέντρο Δηλητηριάσεων 2107793777**. Επικίνδυνο για την άγρια φύση. Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαιρεθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (η ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συστήνουν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση ύποπτης έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της εφαρμογής (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει τον προμηθευτή του προϊόντος και να αποταθεί σε αδειοδοτημένο συνεργείο απειτομώσεων μυοκτονιών. Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι σταθμοί δόλωσης. Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. **Άμεσες και έμμεσες παρενέργειες για τον άνθρωπο:** Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινorrhagia και ματωμένα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα. **Πρώτες βοήθειες: Δερματική έκθεση:** Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό και στην συνέχεια πλούσιο με νερό και σαπούνι. **Έκθεση οφθαλμών:** Ξεβγάλετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης των οφθαλμών ή νερό και κρατήστε τα βλεφάρια ανοικτά τουλάχιστον 10 λεπτά. **Έκθεση από το στόμα:** Ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτε μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει γάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Αναζητήστε άμεσους ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από ένα κατοικίδιο ζώο. **Αντιδότη:** Βιταμίνη K1 που χορηγείται μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό πρόσωπο.



**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
ΦΥΛΑΣΣΑΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕ.  
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.