

# RATSTOP max

STOP PASTA

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε πάστα.  
(Μπλε χρώματος)

Εγγυημένη σύνθεση:  
Brodifacoum 0.0025% β/β  
Βοηθητικές ουσίες:  
99,9974% β/β  
Περιέχει τον πικραντικό-  
αποτρεπτικό παράγοντα:  
denatonium benzoate  
Προορίζεται για ερασιτέχνες (ευρύ κοινό)  
Συσκευασία: 100g



Κάτοχος της  
Έγκρισης-Παρασκευαστής:  
ΑΓΚΡΟΣΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ  
Αριθμός Έγκρισης:  
ΠΠ14-0130-5/3/2018



Αποκλειστική Διάθεση:  
ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.  
www.kiproefodia.gr



**Χρήσεις – Δόσεις:** Κατά των αρουραίων νεογνών & ενήλικων (*Rattus norvegicus*) και ποικίλων νεογνών & ενήλικων (*Mus musculus*), σε εσωτερικούς και (εξωτερικούς χώρους) περιμετρικά των κτηρίων. **Μέθοδος (α) εφαρμογής:** Δολωματική εφαρμογή. Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προσορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικός στην παρήλαση). **Δόση και συχνότητα εφαρμογής:** Α) Αρουραίοι: 100gr έως 200gr δολώματος ανά σημείο δολώματος. Β) Ποικίλοι: 20-40gr δολώματος ανά σημείο δολώματος. Δολώματα σε μορφή πάστας μέσα σε tea bag των 10gr ή 20gr. Εάν απαιτούνται περισσότερα από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. **Οδηγίες χρήσης από το ευρύ κοινό:** Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης. Πριν από τη χρήση τρωκτοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης μη γηχικών αντιμετώπισης (π.χ. πονίδια). Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμίνιοι απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιών, σημεία τροφής, τρύπες, λαγύμια, κλπ). Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές. Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι. Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με νερό. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του. Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης. **Ειδικές οδηγίες χρήσης κατά των ποικίλων και αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους και (εξωτερικούς χώρους) περιμετρικά των κτηρίων από ερασιτέχνες χρήστες:** Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον 2-3 ημέρες, για ποικίλους, και ανά 5-7 ημέρες, για αρουραίους, αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελεγχθεί εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο. Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν. Αντικαθίστετε οποιαδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου:** Εξετάστε το ενδεχόμενο λήξης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις όπες, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών. Μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την προληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για τον εντασιακό δραστηριότητας τρωκτικών). Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας. Μη μετακινείτε ή ανοίγετε. Περιέχει το τρωκτοκτόνο Ratstop Max Pasta με Brodifacoum 0.0025%. Σε περίπτωση συμβάντος τηλεφωνήστε στο **Κέντρο Δηλητηριάσεων 2107793777**. Επικίνδυνο για την άγρια φύση. Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να ελεγχθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για ανατοξικολογική κατάσταση της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απενομιώσεων-μικροκτόνων. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά, με την ίδια συχνότητα επιθεώρησης των δολωματικών σταθμών. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. **Ειδικές πιετικές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειας:** Ιδικές επιδράσεις για το περιβάλλον. Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα. **Πρώτες βοήθειες:** Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάπτωσης τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα αυτιά. Σε σοβαρές περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αιμα στα κόπρανα ή τα ούρα. Αντιόδο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό. Σε περίπτωση έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι. - οφθαλμική έκθεση: ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά. Στοματική έκθεση: ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγήτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναίσθητο άτομο. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάπτωσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάπτωσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας τους:** Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: H373** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P102:** Μακριά από παιδιά. **P301+P310:** Σε περίπτωση κατάπτωσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **P308+P313:** Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης Συμβουλευθείτε γιατρό. **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιεκτικού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις αναγραφόμενες οδηγίες (προφυλάξεις και πρώτες βοήθειες), πριν από την χρήση. **Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης:** Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως. Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα. **Διάρκεια ζωής προϊόντος: 2 Έτη** **Άλλες πληροφορίες:** Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανομή του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγχίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες. Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία. 

**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.  
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.