

# RATSTOP max PELLET

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κουφέτο.  
(Μπλε χρώματος)

Εγγυημένη σύνθεση:  
Brodifacoum 0.0025% β/β  
Βοηθητικές ουσίες:  
99,9974% β/β  
Περιέχει τον πικραντικό-  
αποτρεπτικό παράγοντα:  
denatonium benzoate  
Προορίζεται για ερασιτέχνες (ευρύ κοινό)  
Συσκευασία: 100g



Κάτοχος της  
Έγκρισης Παρασκευαστής:  
ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ  
Αριθμός Έγκρισης:  
ΤΠ14-0129-5/3/2018



Αποκλειστική Διάθεση:  
ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.  
[www.kiproefodia.gr](http://www.kiproefodia.gr)



**ΧΡΗΣΗ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Κατά των ποικιλιών νεαρών έως ενήλικων (*Mus musculus*) και αρουραίων νεαρών έως ενήλικων (*Rattus norvegicus*) και, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των κτιρίων. Μέθοδο(σ)ι εφαρμογής: Εφαρμογή δολωμάτων εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (ανθεκτικών στη παραβίαση) ανά 5 μέτρα τουλάχιστον. Δόση και συχνότητα εφαρμογής: Α) Ποικιλία: 20-40gr δολωμάτων ανά δολωματικό σταθμό. Β) Αρουραίοι: 100gr έως 200gr δολωμάτων ανά δολωματικό σταθμό. Δολώματα σε μορφή κουφέτου (pellets). **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Ειδικές οδηγίες χρήσης: Κατά των ποικιλιών και αρουραίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των κτιρίων: Η τοποθέτηση των σταθμών δόλωσης να γίνεται σε χώρους που δεν πλημμυρίζουν. Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες για ποικιλίας και 5 με 7 ημέρες για τους αρουραίους κατά την πρώτη εφαρμογή και ανά εβδομαδιαία διαστήματα στις επόμενες εφαρμογές, ώστε να ελεγχεται η καταπόνηση του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Επανοδολώνονται εάν χρειάζεται. Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιλυθεί με ρύπους. **Γενικές οδηγίες χρήσης:** Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης. Πριν από τη χρήση τρωκτοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης (π.χ. παγίδες). Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμεία σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθορίσετε τον μολυσμό από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφοφής, λαγύμια, κ.λπ.). Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές. Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι. Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. Μην ανοίγετε τους φακέλλους που περιέχουν το δόλωμα. Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με νερό. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του. Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης. **Άλλες πληροφορίες:** Λόγω της καλύτερης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την καταπόνηση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες. Το προϊόν περιέχει μικρή ποσότητα πικραντικού παράγοντα και μια χρωστική ουσία. **ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2 ΧΡΟΝΙΑ.**

**ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εξετάστε το ενδεδειγμένο πλήθος προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφοφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών. Μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτοκτόνα ως μόνη δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για τον εντοπισμό δραστηριότητας τρωκτικών). Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι: Να χρησιμοποιείται μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας. Μη μετακινείτε ή ανοίγετε. Περιέχει το τρωκτοκτόνο Ratstop Max Pellets με Brodifacoum 0.0025%. Σε περίπτωση στυγμούσης τηλεφωνήστε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 77 93 777. Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα. Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξολοθωθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνηθίσουν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπάνοιες για αποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απενοχώσεων-μυοκτόνων. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά, με την ίδια συχνότητα επεξεύρωσης των δολωματικών σταθμών. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. **Άμμορες ή έμμορες επιφάνειες και οδηγίες α' βοήθειας:** Ειδικές επεξευρώσεις για το περιβάλλον. Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης: τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δερματικής έκθεσης:** Πλύνετε πρώτα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι. **Οφθαλμικής έκθεσης:** Ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά. **Στοματικής έκθεσης:** Ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οπλήσιστε δια του στόματος σε ένα αναίσθητο άτομο. Μην προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδια ζώα, επικοινωνήστε με κτηνίατρο. **Αντιδότο:** Βιταμίνη K1 χρησιμοποιείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

**Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του:** Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις αναγραφόμενες οδηγίες (προφυλάξεις και πρώτες βοήθειες), πριν από τη χρήση. **ΔΗΛΩΣΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: H373:** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επαναληπτική έκθεση. **ΔΗΛΩΣΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P102:** Μακριά από παιδιά. **P301+P310:** Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **P308+P313:** Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε γιατρό. **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Συνήθως αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως. Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.



**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
ΦΥΛΑΣΣΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΑΙ  
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.