

RATSTOP max WHEAT

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε σπόρους
σιταριού. (Μπλε χρώματος)

Εγγυημένη σύνθεση:
Brodifacoum 0.001% β/β
Βοηθητικές ουσίες:
99,999% β/β
Περιέχει τον πικραντικό-
αποτρεπτικό παράγοντα:
denatonium benzoate

Προορίζεται για ερασιτέχνες (ευρύ κοινό)
Συσκευασία: 100g



Αποκλειστική Διάθεση:
ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.
www.kipoefodia.gr



Κάτοχος της Έγκρισης:
Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Παρασκευαστής: TRIPLAN SA
Αριθμός Έγκρισης:
ΤΠ14-0136/28-3-2018



Εγκεκριμένες χρήσεις / Για ερασιτεχνική χρήση: Κατά των ποικίλων (*Mus musculus*) και αρουραίων (*Rattus rattus* & *Rattus norvegicus*) όλων των σταδίων ανάπτυξης, σε εσωτερικούς χώρους και περιμετρικά των κτιρίων από ερασιτέχνες χρήστες. Εφαρμογή δολωμάτων εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση, Δόση και συχνότητα εφαρμογής / Ποικίλων και αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους: Ποικίλοι: 30gr έως 40 gr δολώματος, ανά δολωματικό σταθμό. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1 έως 2 μέτρα. Αρουραίοι: 100gr δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 έως 10 μέτρα. Αρουραίοι, περιμετρικά των κτιρίων: 180gr έως 200gr δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 έως 10 μέτρα.

Οδηγίες για τη χρήση / Γενικές οδηγίες χρήσης: Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν από κάθε χρήση. Πριν από κάθε χρήση τρωκτικοκτότων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες). Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να διασχεράσει την αποδοχή των δολωμάτων. Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, φωλιές, τρύπες, λαούμια, κλπ.). Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατάλληλες κατασκευές. Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα. Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους. Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος. Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται. Τα δολώματα θα πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κλπ.). Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές που δεν πλημμυρίζουν. **Συνθήκες αποθήκευσης:** Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής. **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2 ΧΡΟΝΙΑ.**

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: Μην χρησιμοποιείτε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. βουλιμα τριψάν, απομάκρυνση πιθανών εστιών τροφής και πόσιμου νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόληψη του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επαναπροβολής. Μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την ανίχνευση της δραστηριότητας των τρωκτικών). Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η επαφή των δολωμάτων με το νερό, όταν οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε αποχετευτικά δίκτυα. Όταν τοποθετούνται οι δολωματικοί σταθμοί κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, ρυάκια, κανάλια, εγκαταστάσεις ποτίσματος κλπ.) ή αποχετευτικά δίκτυα, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφευχθεί κάθε επαφή των δολωμάτων με το νερό. Οι πληροφορίες για το προϊόν (η ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν (α) χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό (β) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση και (γ) οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιστημαίνονται κατάλληλα ώστε να αναφέρουν τα παρακάτω: Μην μετακινείτε ή ανοίγετε. Περιέχει το τρωκτικοκτόνο Rat Stop Wheat με brodifacoum 0,001%. Σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο **Κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777**. Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα. Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (η ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συστήνουν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση ύψιστης έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ενημερωθεί τον προμηθευτή του προϊόντος και να αποσπαστεί σε αδειοδοτημένο συνεργείο απεντοσίσεων μυοκτονιών. Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι σταθμοί δόλωσης. Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας στις στοές των τρωκτικών. Μην ανοίγετε τα φακέλκια που περιέχουν το δόλωμα.

Λίψεις και έμμεσες παρενέργειες για τον άνθρωπο: Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και ματωμένα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μύλοιες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα. **Πρώτες βοήθειες: Δερματική έκθεση:** Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια πλύσιμο με νερό και σαπούνι. **Έκθεση οφθαλμών:** Ξεβγάλετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης των οφθαλμών ή νερό και κρατήστε τα βλεφάρων ανοιχτά τουλάχιστον 10 λεπτά. **Έκθεση από το στόμα:** Ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από ένα κατοικίδιο ζώο. Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 που χορηγείται μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό. Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα. **Άλλες πληροφορίες:** Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωσή τους από τα τρωκτικά. Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απομάκρυνσή τους. Το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του:** Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε φραγμένα δολώματα και τη συσκευασία τους σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. **ΦΥΛΑΞΤΕΙΤΕ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**