



Αποκλειστική Διάθεση:
ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.
www.kipofodia.gr

BIOMAX SPECIAL

N-P-K | 7-4-7 +2%Fe +1.5%Mg
+2% δευτερεύοντα στοιχεία και ιχνοστοιχεία
(Ca, Cu, Mn, Mo, V, Zn) +52% οργανική ουσία
& μικροοργανισμούς εδάφους.
Οργανοανόργανο λίπασμα νέου τύπου
(Ομάδα Γ) με χουμικά και ιχνοστοιχεία.



Με τον έλεγχο και την
εγγύηση του Τμ. Χημείας
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (Kg)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΑΤΑΤΑ	Αμμώδες- Αργιλώδες	150/στρέμμα	κατά την προετοιμασία του εδάφους
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ		3-6/δένδρο	πριν ξεκινήσει η βλάστηση
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	Αμμώδες- Αργιλώδες	150-250/στρέμμα	κατά την προετοιμασία του εδάφους
ΒΑΜΒΑΚΙ	Αμμώδες- Αργιλώδες	50-75/στρέμμα	κατά την προετοιμασία του εδάφους
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	Αργιλώδες	80/στρέμμα	κατά την προετοιμασία του εδάφους
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ	Αμμώδες- Αργιλώδες	130/στρέμμα	κατά την προετοιμασία του εδάφους
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ σε όλη την έκταση	Όξινο	120-150/στρέμμα	κατά την προετοιμασία του εδάφους
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ στη γραμμή φύτευσης	Όξινο	75-100/στρέμμα	κατά την προετοιμασία του εδάφους
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	Όξινο	150/στρέμμα	κατά την προετοιμασία του εδάφους
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΑΜΠΕΛΙ	Αργιλώδες	0,15-0,25/πρέμνο	μέχρι την έναρξη της βλαστικής περιόδου.
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΑΜΠΕΛΙ	Αργιλώδες	0,20-0,50/πρέμνο	μέχρι την έναρξη της βλαστικής περιόδου.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	Αμμώδες- Αργιλώδες	3-5/δένδρο	στην έναρξη της βλαστικής περιόδου
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	Αργιλώδες	3-5/δένδρο	στην έναρξη της βλαστικής περιόδου
ΦΥΣΤΙΚΙ	Αμμώδες- Αργιλώδες	6-8/δένδρο 1/δένδρο	τέλος χειμώνα Μάιο, Ιούνιο
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ (ΓΚΑΖΟΝ)		200-400/στρέμμα 50-75/στρέμμα	κατά την προετοιμασία του εδάφους επιφανειακά
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ		0,05-0,5/θάμνο	στην έναρξη της βλαστικής περιόδου

Αριθμ. Κυκλοφορίας 247 κατάλληλο για τις βιολογικές καλλιέργειες καν. ΕΥ 848 (2018)

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 80% ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (SLOW RELEASE) ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΖΕΛΟΙΘΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΜΥΚΗΤΕΣ, ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΕΣ)

25kg

